

DESCRIPTION

Fainal® K est un engrais liquide riche en potassium et en azote uréique

Fainal® K ne contient pas de chlore. Il peut être utilisé en application foliaire ou au sol sur toutes cultures y compris les cultures hors sol.

Fainal® K est recommandé au stade grossissement et pendant la coloration des fruits.

Fainal® K prévient et corrige les carences en potassium.

Fainal® K prévient les antagonismes avec les ions Ca^{++} et Mg^{++} présents dans les eaux dures qui diminuent fortement l'efficacité des engrais potassiques, cela, grâce aux chélates EDTA libre qu'il contient.



Fainal® K



COMPOSITION

- ☐ Oxyde de potassium (K_2O) : 46,5 % (p/v)
- ☐ Azote uréique (N) : 4,5 % (p/v)
- ☐ EDTA : 1,5 % (p/v)

UTILISATION ET DOSES D'EMPLOI

CULTURES	DOSES (L/Ha)
En foliaire	
Pomme de terre	150 à 200 ml/hl (1,5 à 2 L/ha) par application. Effectuer 3 pulvérisations foliaires à partir du stade tubérisation, au grossissement jusqu'à la maturité
Toutes cultures	150 à 200 ml/hl (1,5 à 2 L/ha) par application. Effectuer 3 pulvérisations foliaires à partir du stade grossissement jusqu'à la maturité
En fertigation	
Cultures maraichères	40 à 60 L/Ha, repartis en 03 à 04 injections chaque 10 Jours, à partir de la nouaison jusqu'à la fin du stade grossissement
Agrumes	150 à 225 ml/arbre, repartis en 3 à 5 injections à partir de la nouaison jusqu'à la fin du grossissement des fruits
Arbres fruitiers	200 à 300 ml/arbre, repartis en 3 à 5 injections à partir de la nouaison jusqu'à la fin du grossissement des fruits
Olivier	100 à 150 ml/arbre, repartis en 2 injections à partir de la nouaison et au grossissement des fruits

COMPATIBILITE

Fainal® K est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires.

Ne pas mélanger avec d'autres chélates ni avec des produits à pH très acides ($\text{pH} < 3$).

Effectuer un essai avant emploi.



Atlas Agricole S.A.

