

مبيد ورقي جهازى ضد الأعشاب

HERBICIDE FOLIAIRE SYSTEMIQUE



رانداپ برو
Roundup[®]
PRO

FORMULATION SPECIALE CONTENANT:

360 G/L DE GLYPHOSATE (441 G/L DE SEL DE POTASSIUM)

+ 72 G/L DE SURFACTANT TYPE TRANSORB[™]

(BREVET Monsanto ep-b1-0 820 231)

POUR PLUS DE RAPIDITE ET D'EFFICACITE

تركيبة جديدة تحتوي على 360 غ/ل من الثليفوزات
في شكل ملح البوتاسيوم



فعال حتى في الظروف الصعبة :
Hygrométrie à partir de 50% رطوبة ابتداء من 50%
Température de 1 à 30°C درجة حرارة من 1 إلى 30 درجة




Délai à la pluie: 1 heure
فعالية تامة حتى عند نزول المطر بعد ساعة



Délai avant travail du sol sur annuelles: 6 heures
مدة الانتظار قبل الحرث: 6 ساعات في الزراعات الحولية




Délai avant travail du sol sur vivaces: 4 jours
مدة الانتظار قبل الحرث: 4 أيام في الزراعات المعمرة



Bonne efficacité même en présence d'eau dures
فاعلية جيدة حتى عندما تكون المياه ذات ملوحة عالية



Formulation minimisante de la dérive
مقاوم للانحراف بصفة جيدة



MONSANTO



LES CARACTERISTIQUES DE ROUNDUP® PRO

ROUNDUP® PRO est un désherbant total systémique qui contient 360 g/l de glyphosate (441 g/l de sel de potassium de glyphosate) + 72 g/l de surfactant type **TRANSORB™**, efficace contre la plupart des mauvaises herbes annuelles, vivaces ou pérennes.

LA TECHNOLOGIE TRANSORB™

Présente des performances d'action inédites:

- une quantité plus importante de glyphosate pénètre dans la plante grâce à un plus grand étalement de la gouttelette de pulvérisation à la surface de la feuille,
 - une diffusion plus rapide et plus complète du glyphosate vers toutes les zones de croissance de la plante (méristèmes des racines, tiges et feuilles),
 - délai à la pluie de 1 heure après traitement,
 - délai avant travail du sol réduit:
- * 6 heures après traitement sur mauvaises herbes annuelles.
* 4 jours après traitement sur mauvaises herbes vivaces.
- un bon comportement en cas des eaux dures.

MODE D'ACTION

ROUNDUP® PRO pénètre dans les plantes à travers les feuilles et les parties vertes ou bois non lignifié. Transporté en quelques heures par la sève jusqu'à l'extrémité des racines. **ROUNDUP® PRO** agit par le blocage de la biosynthèse des acides aminés et détruit complètement les parties aériennes et souterraines des mauvaises herbes.

Les premiers symptômes apparaissent de 3 à 20 jours après le traitement.

Sur certaines espèces pérennes, dont les ligneux et semi-ligneux, traitées à l'automne, les premiers symptômes apparaissent au redémarrage de la végétation au printemps suivant.

USAGES ET DOSES D'EMPLOI

Toutes cultures: mauvaises herbes annuelles: 1,5 à 2 l/hl
Toutes cultures: mauvaises herbes vivaces: 2 à 3 l/hl
Dans le cas des cultures pérennes, il faut éviter toute projection de bouillie sur les parties vertes non lignifiées de la culture.

CONSEILS D'UTILISATION

Traiter lorsque les parties aériennes des mauvaises herbes sont bien développées.

Utiliser de préférence un volume d'eau de 300 l/ha.

خاصيات رانداب برو

رانداب برو مبيد أعشاب كلي جهازي يحتوي على 360 غ/ل من القليفوزات (441 غ/ل من ملح بوتاسيوم القليفوزات) + 72 غ/ل من مادة لاصقة من نوع ترانسورب وهو فعال ضد أغلب الأعشاب الطفيلية الحولية و المعمرة.

تكنولوجيا ترانسورب

تمكن هذه التكنولوجيا الفريدة من:
تسرب كمية أكبر من القليفوزات داخل الأعشاب بفضل التوزيع الجيد للخليط على سطح الأوراق.
تسرب سريع للقليفوزات داخل النبتة قبل جفاف قطرات الرش.
انتشار سريع و شامل للقليفوزات في كل أجزاء النبتة (الأوراق والأغصان والجذور).
إمكانية المداواة ساعة واحدة قبل هطول الأمطار.
إمكانية حرث الأرض 6 ساعات بعد الرش بالنسبة للأعشاب الطفيلية الحولية و 4 أيام بالنسبة للأعشاب الطفيلية المعمرة.
فاعلية جيدة حتى عندما تكون المياه ذات ملوحة عالية.

طريقة التأثير

يتسرب رانداب برو داخل النبتة عن طريق الأوراق و الأجزاء الخضراء الأخرى ثم ينتقل خلال بضع ساعات إلى الجذور.
يتسبب رانداب برو في عرقلة إنتاج الأحماض الأمينية الضرورية لنمو النبتة مما يؤدي إلى القضاء كلياً على الأعشاب الطفيلية.
تظهر الأعراض الأولى لإصابة الأعشاب الطفيلية من 3 إلى 20 يوم بعد الرش.

الاستعمالات و المقادير

كل الزراعات: الأعشاب الطفيلية الحولية : 1.5 إلى 2 ل / 100 لتر
كل الزراعات: الأعشاب الطفيلية المعمرة : 2 إلى 3 ل / 100 لتر
جنب رش المبيد على الأوراق و الأجزاء الخضراء للغراسات.

توجيهات الاستعمال

تقع مداواة الأعشاب الطفيلية عندما تكون الأعشاب الطفيلية في حالة نمو جيدة.
يستحسن استعمال كمية خليط تقدر ب 300 لتر في الهكتار.